

# RÉACTIONS ALLERGIQUES GRAVES



Un enfant peut avoir une réaction allergique grave, appelée **ANAPHYLAXIE**, s'il a un ou plusieurs de ces signes rapidement **après avoir mangé** ou avoir été **piqué par un insecte**.

**PENSEZ-Y!**

## MALAISE

**Faiblesse** importante, **étourdissements**, **pâleur**, changement de **comportement**, **ne se sent pas bien**, se sent **bizarre**, **perte de connaissance**.

et / ou

## PEAU

**Urticaire** (boutons comme des piqûres d'orties), **rougeurs** qui s'étendent rapidement, **gonflements** des lèvres, de la langue ou du visage, **démangeaisons**.

## RESPIRATION

Difficultés à **respirer** ou à **parler**, **toux**, respiration **sifflante**, voix qui change.

et / ou

## DIGESTIF

Maux de ventre (**crampes**), **vomissements**, **diarrhée**.



**VOUS POUVEZ LUI SAUVER LA VIE EN UTILISANT VITE LE STYLO D'ADRÉNALINE ET EN APPELANT LES SECOURS (15 OU 112) CHACUN D'ENTRE NOUS PEUT LE FAIRE !**

COMMENT UTILISER  
LE STYLO D'ADRÉNALINE



ANAPEN



EMERADE



EPIPEN



JEXT



GRE TAA



Groupe de travail  
allergie à l'école



Société française  
d'allergologie



Liberté  
Égalité  
Fraternité